

Aizsargiepakojuma marķējums

**TRICO  
Repelents**

Repelents staltbriežu, stirnu un alju bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apīnu un melnā plūškoka stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs.

**Darbīgā viela:** aitu tauki 65 g/l

**Preparatīvā forma:** emulsija ūdenī

**Reģistrācijas Nr. 0435**

**Reģistrācijas klase:** 3

**Iepakojums:** 5 L, 10 L

**Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma**

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

**APSTIPRINU**  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja

R. Čudere

2015. g. 05. jūnijā

**EUH208** Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

**P102** Sargāt no bērniem.

**P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

**P501** Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības”.

**SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

**SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

**Derīguma termiņš**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese**

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6

A-1010 Vīne

Austrija

Tel. +43 (0)5 997710

[www.kwizda-agro.at](http://www.kwizda-agro.at)

**Preparāta izplatītājs Latvijā**

SIA « American Equipment & Supply »

Lomonosova iela 1, korpus 18

Tel. : +371 67100542

Fakss : +371 67100543

**SANEMTS N<sup>o</sup>. 482**

Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļā

2015. g. 5. jūnijā

Iepakojuma marķējums

**TRICO  
Repelents**

Repelents staltbriežu un stirnu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apļu un melnā plūškoka stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs.

**Darbīgā viela:** aitu tauki 65 g/l

**Preparačīvā forma:** emulsija ūdenī

**Reģistrācijas Nr. 0435**

**Reģistrācijas klase:** 3

**Iepakojums:** 5 L, 10 L

**Partijas Nr.** skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

**EUH208** Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

**P102** Sargāt no bērniem.

**P280** Izmantot aizsargcimdos/aizsargdrēbes.

**P501** Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības”.

**SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

**SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

**Derīguma termiņš**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese**

Kwizda Agro GmbH

Universitätsring 6

A-1010 Vīne

Austrija

Tel. +43 (0)5 997710

[www.kwizda-agro.at](http://www.kwizda-agro.at)

**Preparāta izplatītājs Latvijā**  
SIA « American Equipment & Supply »  
Lomonosova iela 1, korpus 18  
Tel. : +371 67100542  
Fakss : +371 67100543

## **PIRMĀ PALĪDZĪBA**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473**

## **DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu.

Gatavojoš šķīdumu, samaisot un izsmidzinot atšķaidītu produktu, valkāt garās bikses, kreklu ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un aizsargcimdus (piemēram, polivinilhlorīda, lateksa un tml.)

Strādājot apstrādātajās zonās, nepieciešams valkāt garās bikses, kreklu ar garām piedurknēm, slēgtus apavus un, ieteicams, aizsargcimdu.

## **PREPARĀTA APRAKSTS**

Repelents Trico ir paredzēts lietošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā staltbriežu un stirnu bojājumu ierobežošanai rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumos, vīnogulāju, apiņu un melno plūškoku stādījumos, lapu koku un skuju koku audzēs. Preparāts darbojas kā atbaidīšanas līdzeklis, balstoties uz izmantotajām smaržvielām un garšas piedevām. Preparāts satur markieri, kas ļauj identificēt apstrādātās augu virsmas.

Dažādas lapu koku un skuju koku sugars, īpaši to jaunaudžu stādījumos, jauno kociņu galotņu dzinumus bojā stirnas, alpi un staltbrieži. Sistemātiska, mērķtiecīga jaunaudžu apstrāde ar Trico nodrošinās jauno kociņu netraucētu augšanu.

Trico ir uzsmidzināms uz augu daļām rudenī, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas ziemā, vai arī visa veģetācijas perioda laikā, lai pasargātu augus no dzinumu nograušanas vasarā.

## **LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**

### **Rapša, kukurūzas, saulespuķu sējumi**

Deva: 15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 200 l/ha.

Apstrādāt sējumus sākot ar 2 lapu stadiju līdz ziedēšanas sākumam (AS 12-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: četras reizes. Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas.

Apsmidzina sistemātiski jaunās augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu un staltbriežu bojājumiem.

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, nepastrādāt sējumos karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt sējumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

### **Lapu koku un skuju koku audzes**

Deva: 10-20 l/ha.

Preparāta deva atkarīga no augu lieluma.

Produktu lietot neatšķaidītu!

Lai novērstu staltbriežu, alņu un stirnu bojājumus ziemā, apstrādāt stādījumus rudenī.

Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Lai novērstu staltbriežu un stirnu bojājumus vasarā, apstrādāt stādījumus pavasarī.

Maksimālais apstrāžu skaits: viena reize.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Produkts ir gatavs lietošanai. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus.

Apsmidzina augu daļas, kuras nepieciešams pasargāt no stirnu un staltbriežu bojājumiem. Ja apstrādi veic ļoti karstos laika apstākļos, neapsmidzināt tieši jaunos dzinumus.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī, ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apstrādes kvalitātes (vai ir pietiekams darba šķidruma izlietojums) kontroli smidzināšanas laikā palīdz novērtēt pievienotais markieris.

### **Vīnogulāji**

*Ražojoši vīnogulāju stādījumi*

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīs lapu stadījuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas.

Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk, kā 75 dienas pirms ražas novākšanas.

*Jauni vīnogulāju stādījumi*

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha. Preparāta deva un darba šķidruma tilpums atkarīgs no stirnu un staltbriežu populācijas lieluma, kultūrauga lieluma.

Apstrādāt stādījumus, sākot ar vīnogu trīs lapu stadīju (AS 13).

Maksimālais apstrāžu skaits: divas reizes. Intervāls starp apstrādēm 28-42 dienas, atkārtotu apstrādi veicot, kad novērotas jaunas bojājumu pazīmes.

**Piezīme:** Lietojot Trico jaunos vīnogu stādījumos, novērst iespējamu produkta nokļūšanu uz blakus esošiem ražojošiem vīnogu stādījumiem pēc to ziedēšanas sākuma stadijas )AS 61).

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni attiecībās no 1:3 līdz 1:5. Apstrādi var veikt, izmantojot komerciālos rokas vai muguras smidzinātājus, vai tuneļveida smidzinātājus.

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, nepastrādāt stādījumus karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Vīnogulāju stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem. Vienu nedēļu pirms un pēc apstrādes ar Trico neveikt vīnogulāju stādījumu apstrādi ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

### **Apiņu stādījumi**

Deva: 10-15 l/ha.

Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 30-50 l/ha.

Lai pasargātu apiņu stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no apiņu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata. Preparātu atšķaida ar ūdeni attiecībās no 1:3 līdz 1:5.

Sistemātiski apstrādāt apiņu augu apakšējo daļu līmenī, ko var sasniegt un bojāt staltbrieži un stirnas (līdz 2 m augstumam).

Karstās dienās apstrādi veic no rīta vai vakaros, nepastrādāt stādījumus karstos laika apstākļos.

Lai nodrošinātu vienmērīga pārklājuma veidošanos, jāļauj apsmidzinātajām augu daļām apžūt. Tāpēc nesmidzināt pirms lietus vai arī ja paredzams, ka apstrādātie augi nepaspēs apžūt pirms lietus.

Apiņu stādījuma apstrādei Trico nelietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības vai mēslošanas līdzekļiem.

### **Melnā plūškoka stādījumi ogu ieguvei**

Deva: 10-15 l/ha. Produktu lietot atšķaidītu. Darba šķidruma pagatavošanai plānotajam produkta daudzumam pievienot ūdeni devā 50 l/ha.

Lai pasargātu melnā plūškoka stādījumus no staltbriežu un stirnu bojājumiem, apsmidzināt stādījumus, sākot no jauno dzinumu veidošanās sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 31-61).

Maksimālais apstrāžu skaits: trīs reizes. Intervāls starp apstrādēm 14-21 diena.

### **UZMANĪBU!**

Pirms Trico lietošanas apiņa un melnā plūškoka stādījumos, tā drošumu kultūraugiem un efektivitāti vēlamis noskaidrot vietējos audzēšanas apstākļus.

**Lietojot apiņu, ražojošu vīnogu un plūškoku stādījumos nevar izslēgt iespējamu ietekmi uz produkcijas kvalitāti.**

## **DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA**

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Pirms lietošanas Trico kanna labi jāsakrata.

Ja preparāts jālieto atšķaidījumā, smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Trico daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

## **SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA**

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni un izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

## **TUKŠAIS IEPAKOJUMS**

Tvertni likvidēt saskaņā ar valsts likumdošanu.

Tvertnes trīs reizes izmazgāt ar tīru ūdeni, un iepakojumu likvidēt saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Iztukšoto iepakojumu neizmantot citādiem mērķiem.

## **VIDES AIZSARDZĪBA**

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku un traukus ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

## **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 30 °C.

## **DERĪGUMA TERMIŅŠ**

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

## **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta lietošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.